

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Πώς να πάρετε την Καπσειταβίνη

Τα δισκία Καπσειταβίνης πρέπει να **καταπίνονται με νερό**.

Ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να πάρετε ένα συνδυασμό δισκίων 150 mg και 500 mg για κάθε δόση.

- Να λαμβάνετε τα δισκία στο συνδυασμό που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
- Να λαμβάνετε τα δισκία μέσα σε **30 λεπτά από το τέλος ενός γεύματος** (πρωινό και δείπνο).
- Είναι σημαντικό να λαμβάνετε όλη τη φαρμακευτική σας αγωγή όπως έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας.

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Καπσειταβίνης από την κανονική επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε την επόμενη δόση.

Εάν ξεχάσετε να πάρετε την Καπσειταβίνη

μην πάρετε καθόλου τη δόση που ξεχάσατε και μη διπλασιάσετε την επόμενη.

Αντ' αυτού, συνεχίστε το κανονικό δοσολογικό σχήμα σύμφωνα με την υπόδειξη του ιατρού σας.

Πώς να φυλάσσεται την Καπσειταβίνη

- Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
- Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C
- Να μη χρησιμοποιείτε την Καπσειταβίνη μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και στην ετικέτα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Δόση (σημειώστε αριθμό δισκίων που ελήφθησαν)

Ημερομηνία
(Ημ/Μην/Έτος)

Πρωινή Δόση
500mg 150mg

Βραδυνή Δόση
500mg 150mg

Παρατηρήσεις - Σχόλια

(παρακαλείσθε να σημειώσετε τις σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίσατε)

	Δόση Έναρξης	Δόση Έναρξης		
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				
/ / /				

Διακοπή Θεραπείας