

Η οστεονέκρωση της γνάθου είναι ασυνήθης, μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί

Τι είναι η οστεονέκρωση της γνάθου;

Η οστεονέκρωση της γνάθου χαρακτηρίζεται από την έκθεση του οστού στη γναθοπροσωπική περιοχή χωρίς τάσεις επούλωσης. Ενδέχεται να παρουσιαστεί¹

- σε σχέση με οδοντιατρική χειρουργική επέμβαση
- αυθόρμητα

Οι ασθενείς που εμφανίζουν κλινικά χαρακτηριστικά οστεονέκρωσης της γνάθου θα πρέπει να παραπέμπονται αμέσως σε οδοντίατρο¹

Η οστεονέκρωση της γνάθου διαγιγνώσκεται από τον οδοντίατρο όταν υπάρχει¹

- απουσία ενδείξεων επούλωσης μετά από 6 εβδομάδες κατάλληλης αξιολόγησης και οδοντιατρικής περίθαλψης
- απουσία μεταστατικής νόσου στη γνάθο ή οστεοραδιονέκρωση

Πιθανοί παράγοντες κινδύνου για την οστεονέκρωση της γνάθου

Παρόλο που οι αιτίες της οστεονέκρωσης της γνάθου δεν είναι καλά κατανοητές, έχουν αναφερθεί ασυνήθεις περιπτώσεις σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες με στόχο τα οστά (όπως είναι τα διφσφονικά και οι αναστολείς RANKL). Παρόλα αυτά, δεν έχει θεμελιωθεί αιτιώδης σχέση^{2, 5}

Οι παράγοντες που ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο οστεονέκρωσης της γνάθου περιλαμβάνουν^{3,4}

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Μεθόδους θεραπείας όπως είναι η ακτινοβολία, η χημειοθεραπεία και τα κορτικοστεροειδή• Καρκίνος• Λοίμωξη• Περιοδοντική νόσος | <ul style="list-style-type: none">• Οδοντιατρικές διεργασίες (π.χ. εξαγωγή οδόντος)• Χρήση οιοπνεύματος και κάπνισμα• Κακή διατροφή• Διαταραχές πηκτικότητας και αγγειακές διαταραχές |
|---|--|

Η οστεονέκρωση της γνάθου είναι ένα ασύννηθες ανεπιθύμητο συμβάν

- Η συνολική συχνότητα σε μεγάλες αναδρομικές μελέτες ήταν μικρότερη του 1%
- Οι εκτιμήσεις για τη συχνότητα διαφέρουν μεταξύ των ομάδων δεδομένων